

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO,  
RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA**

**BOLLETTINO DI PRODUZIONE BIOLOGICA OLIVO  
n° 21 del 19 ottobre 2017**

**SITUAZIONE METEOROLOGICA**

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito [www.osmer.fvg.it](http://www.osmer.fvg.it)  
Per i prossimi giorni si prevede tempo mite e stabile, con peggioramento verso la domenica.

**FENOLOGIA**

In tutti gli areali monitorati le drupe di varietà toscana presentano la fase fenologica d'invaiatura; sul litorale e nel comprensorio di S. Dorligo della Valle continua l'inizio dell'invaiatura sulla varietà Bianchera.



**SITUAZIONE FITOSANITARIA**

**MOSCA DELL'OLIVO (*Bactrocera oleae*)**

In quasi tutto l'areale triestino viene rilevato un aumento delle catture della mosca dell'olivo con conseguente incremento dell'infestazione.

## **PIOMBATURA (*Pseudocercospora cladosporioides*) e OCCHIO DI PAVONE (*Spilocaea oleaginea*)**

Continuano nuovi inoculi a carico delle foglie giovani soprattutto nelle zone con ristagni di umidità.

### **STRATEGIE DI DIFESA**

#### **Parassiti:**

#### **MOSCA DELLE OLIVE (*Bactrocera oleae*)**

Visto l' avvicinarsi del periodo di raccolta non sono consigliati interventi.

Si consiglia un monitoraggio per stabilire il valore di infestazione attiva sui propri oliveti. Se vengono stimati valori di infestazione attiva superiori al 6-8% (presenza di uova e larve giovani di prima e seconda età) si consiglia di **programmare la raccolta anticipata** ed una tempestiva lavorazione delle olive per limitare la perdita di qualità dell'olio.

## **OCCHIO DI PAVONE (*Spilocaea oleagina*) e PIOMBATURA (*Pseudocercospora cladosporioides*)**

Si consiglia di **attendere la fine delle operazioni di raccolta** per poi effettuare un trattamento rameico di chiusura il quale oltre ad ostacolare eventuali patologie fungine, lignificare i giovani rametti, cicatrizzare le eventuali ferite, preparerà la pianta alla stagione invernale.

### **RACCOLTA**

Al fine di preservare la qualità del prodotto, **per quanto riguarda le varietà toscane**, si consiglia di prenotare il frantoio e di prepararsi alla raccolta .

Per chi preferisce optare per **un' unica raccolta (toscano e Bianchera)** il periodo migliore ricade dall' ultima settimana di Ottobre in poi.

Si ricorda che le olive devono essere conservate in apposite cassette forate, per evitare formazioni di muffe e conseguente irrancidimento della polpa, inoltre la molitura delle olive deve avvenire massimo tra le 24/36 ore dopo la raccolta.

Si raccomanda di programmare la raccolta rispettando rigorosamente il tempo di carenza del prodotto utilizzato per l'ultimo trattamento effettuato.

Ai fini dell'ottenimento di una migliore qualità dell'olio si consiglia di raccogliere le olive direttamente dalle piante eliminando quelle danneggiate dalle infestazioni della mosca o quelle cadute a terra.

La conservazione delle olive, in attesa della frangitura, deve avvenire in cassette forate in strati sottili in un locale fresco ben areato. La frangitura delle olive deve avvenire entro le 24-48 ore dalla raccolta.

### **CONTROLLI DI MATURAZIONE**

Dai controlli effettuati in campo **si evidenzia una maturazione precoce** sia delle varietà toscane che di quelle nostrane come la Bianchera. (Tabella 3)

## Elenco dei frantoi in Regione e zone limitrofe

CIVIDALE – ITAS - Via dell'Istituto Tecnico Agrario 42; tel. 333 1064912

RAGOGNA loc. Pignano – Frantoio Lizzi - Via Pellegrino da S. Daniele 3; tel.333 2069947

PALAZZOLO DELLO STELLA - Frantoio Olistella - via casali Moretton 30/b; tel. 339 7826173

TRIESTE - Agricola di Trieste Soc. Coop. - Via Travnik 10; tel. 040 8990111

TRIESTE - Parovel Group. S.r.l. - Zona Artigianale Dolina 546; tel. 040 227050 040 8326364

DOBROVO (SLO); tel. 386 31523894; 386 53044053

FRANTOIO Lisjak,–Slovenia Šalara 28b, 6000 Koper, Slovenia t: +386 40 294 248/+386 31 893 378

CAPPELLA MAGGIORE (Tv) – Coop. REITIA-Via Cal Alta 57; tel. 0438 930221; c.3774143149

Tabella 1 catture di mosca dell'olivo (*Dacus oleae*)

Provincia	Comune	Località	28° sett.	29° sett.	30° sett.	31° sett.	32° sett.	33° sett.	34° sett.	35° sett.	36° sett.	37° sett.	38° sett.	39° sett.	40° sett.	41° sett.	42° sett.
PN	Caneva	Stevenà	0	2	1	4	0	13	1	13	8	4	5	5	2	0	-
PN	Caneva	Demarco	1	2	4	4	2	26	10	8	11	8	10	4	3	0	-
PN	Polcenigo	Coltura	0	1	0	2	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	-
PN	Aviano	Basaldella	7	1	2	1	2	1	0	0	3	0	3	0	1	0	-
PN	Caneva	Casagrande (BIO)	4	3	2	8	4	7	1	5	11	3	3	2	1	0	-
PN	Caneva	Casagrande (BIO)	1	1	3	3	0	0	-	3	7	5	3	5	0	0	-
PN	Pinzano	Perisinotto	2	0	0	1	1	6	1	3	6	2	1	1	0	0	-
UD	Ragogna	Villuzza	1	1	1	0	0	3	1	2	18	6	1	1	1	0	-
UD	Osoppo	Venturini	0	0	0	1	0	3	1	0	0	5	1	1	1	0	-
UD	Tarcento	Sottoriviera	1	0	1	0	1	0	0	1	0	2	2	7	1	2	-
UD	Tricesimo	Adorgnano	0	1	0	0	1	0	3	1	7	2	2	2	0	0	-
UD	Faedis	Campeglio	0	0	1	2	1	0	4	1	5	3	2	3	2	1	-
UD	Gemona	Facchin (BIO)	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	2	1	1	1	-
UD	Rodeano	Coseanetto	0	0	0	2	1	0	1	9	1	5	10	1	2	1	-
UD	Martignacco	Delendi	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	-
UD	Cividale	Ducale	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	2	2	0	4	-
UD	Cividale	Gagliano	0	0	0	0	2	5	1	0	1	2	2	0	1	1	-
UD	Buttrio	Caminetto	0	0	1	2	1	0	1	0	2	2	2	0	0	0	-
UD	Codroipo	Beano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
UD	Cividale	Spessa (BIO)	0	2	3	1	0	2	0	1	0	0	0	0	1	1	3
UD	Castions di St	Ellis	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	-

UD	Pertegada	Lorenzonetto	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	-
GO	Cormons	Monte Quarin	0	1	2	0	3	4	5	0	0	0	1	0	0	1	3
GO	Ronchi	Selz	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	2	4
GO	Monfalcone	S. Canzian d' Is.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GO	Sagrado	Sagrado (BIO)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TS	Duino Aurisina	Medeazza (BIO)	0	2	1	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	1	3
TS	San Dorligo	S Giuseppe(BIO)	0	1	2	1	0	2	3	1	2	1	0	1	0	14	11
TS	San Dorligo	Dolga Kr. (BIO)	1	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	2	0	7	10
TS	Duino Aurisina	Sgonico	5	3	1	0	0	1	0	0	2	3	0	0	22	0	2
TS	Duino Aurisina	Contovello	4	1	5	0	0	4	6	1	1	7	18	23	11	13	18
TS	Trieste	Costalunga	2	0	0	5	0	3	20	5	2	4	11	9	0	18	23
TS	San Dorligo	Moccò	0	1	1	1	0	2	2	0	0	0	1	2	14	2	7
TS	San Dorligo	Bagnoli	1 1	3	13	8	1 0	7	18	1	3	4	4	15	11	12	17
TS	San Dorligo	Domio	3	1	3	0	1	15	11	1	0	8	2	1	2	7	15
TS	San Dorligo	Caresana	2	0	5	0	0	4	6	0	1	3	4	6	25	24	21
TS	Muggia	S.Barbara	2	3	6	8	5	30	16	35	6	15	38	25	12	24	36
TS	Muggia	Darsella	1	2	10	13	7	42	14	3	12	4	24	3	2	12	24
TS	Muggia	Chiampore	5	2	0	1	0	8	7	1	6	5	9	17	0	2	6

Tabella 2 (% di infestazione attiva) 42° settimana; in verde le aziende biologiche.

Prov.	Comune	Località	No. frutti	Punture sterili	Uova	Larve vive 1. età	Larve morte 1. età	Larve vive 2. età	Larve morte 2. età	Larve vive 3. età	Larve morte 3. età	Pupe vive	Pupe morte	Fori uscita	% INFESTAZIONE ATTIVA	% INFESTAZIONE DANNOSA	% INFESTAZIONE TOTALE	% MORTALITA' I e II età
GO	Cormons	Monte Quarin	100	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
GO	Ronchi	Selz	100	2	0	1	3	1	1	0	0	0	0	3	2	3	5	4
GO	Monfalcone	San Canzian D'isonzo	100	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
TS	Duino Aurisina	Sgonico	100	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	0
TS	Trieste	Contovello	100	2	2	3	0	2	0	2	0	3	0	2	7	7	14	0
TS	Trieste	Costalunga	100	6	2	4	0	8	0	9	0	5	0	12	14	26	40	0
TS	San Dorligo	Moccò	100	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
TS	San Dorligo	Bagnoli	100	1	0	4	0	1	0	7	0	4	0	10	5	21	26	0
TS	San Dorligo	Domio	100	1	1	3	0	0	0	2	0	3	0	4	4	9	13	0
TS	San Dorligo	Caresana	100	2	1	4	0	3	1	6	0	2	0	2	8	10	18	1
TS	Muggia	S.Barbara	100	2	1	5	1	1	2	3	0	1	0	2	7	6	13	3
TS	Muggia	Darsella	100	1	0	6	0	4	1	7	0	8	0	9	10	24	34	1
TS	Muggia	Chiampore	100	2	0	2	1	1	2	1	0	0	0	2	3	3	6	3
UD	Cividale	Spessa	100	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2	3	2	5	0
GO	Sagrado	Sagrado	100	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TS	Duino Aurisina	Medeazza	100	1	0	3	0	2	0	5	0	3	0	4	5	12	17	0
TS	S. Dorligo d. V.	San Giuseppe	100	0	0	4	0	2	0	4	0	6	0	2	6	12	18	0
TS	San Dorligo d. V.	Dolga Krona	100	1	1	2	0	4	0	4	0	3	0	3	7	10	17	0

Tabella 3 Rilievi di maturazione

Località	Varietà	Dinamometro gr.	Penetrometro gr/mm2	invaiaura %
Sagrado BIO	Leccino	-	-	-
	Grignano	-	-	-
Selz	Bianchera	600	390	5,00%
	Leccino	410	270	90,00%
Medeazza	Bianchera	530	350	5,00%
	Leccino	420	300	70,00%
BIO	Grignano	510	280	50,00%
	Bianchera	650	400	0,00%
Sgonico	Leccino	490	340	70,00%
	Bianchera	580	430	5,00%
Contovello	Leccino	330	200	100,00%
	Maurino	310	260	80,00%
Caresana	Bianchera	550	360	10,00%
	Leccino	440	310	60,00%
Bagnoli	Bianchera	560	390	0,00%
	Leccino	400	290	100,00%
	Bianchera	650	400	5,00%
Domio	Leccino	400	300	80,00%
	Bianchera	580	380	5,00%
Dolga Krona BIO	Leccino	440	310	80,00%
	Bianchera	540	370	5,00%

Per ulteriori informazioni:

ERSA – Sezione olivicoltura UD-GO-PN cell. 3346564270;

TS tel. 040 3775852 cell. 3357543021